

Кеңес беру есебі

такырыбы «Кияр дақылдының негізгі аурулары және оларға қарсы күрес шаралар»

күні
«03» шілде 2023 жыл

Кеңес беру орны:
Алматы облысы, Жамбыл ауданы,
Ұзынағаш ауылы, Зикринова көшесі, 124 үй, «Болашақ» ШК

Сарапшы Есжанов Т.К.
(қолы)

Басқарма төрағасы
«Ж.Жиембаев атындағы ҚазҰҚжКГЗИ» ЖШС



Дүйсембеков Б.А.

Есеп құрылымы

1) Кеңес беруді қажет ететін мәселе немесе мәселелер ауқымы;

Кияр дақылының негізгі аурулары және оларға қарсы күрес шаралар.

2) Кеңейтілген дәлелдерді немесе қызметті жақсарту бойынша ұсыныстарды қамтуы тиіс берілген мәселені немесе мәселелер ауқымын шешуге арналған сараптының ұсыныстары;

Кияр дақылының ауруларымен агротехникалық, алдын-алу, химиялық және биологиялық әдістерді қолдана күрсуге болады.

Агротехниалық шаралар – егісте ауруға төзімді сорттар мен гибридтер қолдану (мысалы шілде сорты жалған ак ұнтаққа төзімді). Ауыспалы егістің сақталуы, егінді 3-4 жылдан кейін бастапқы орнына қайтару, жылыжайлармен былтырғы асқабақ дақылдарынан 1000 м арақашықтықты сақтау, алғы егістерді дұрыс тандау – бұршактұқымды, көпжылдық шөптөр, пияз, қызанақ, ерте орамжапырақты, картоп.

- Адын алу шараларына – тұқымды, себер алдын, бактериялық, санырауқұлактық инфекцияларға және бастапқы өсу этапында зиянкестерге қарсы Превикур энерджи В.К. (1%) + Престиж к.с. (1%) + Фитолавин, ВРК (2%) корғап ынталандыруышы құрамдармен өндөу.

- Химиялық шараларға - қиярдың негізгі аураларының бірі жалған ак ұнтаққа қарсы қолданылатын химиялық шараны айтуға болады. Аурудың алғашқы белгілері көріне салысымен Тянь-Шань, 72% с.ұ. гектарына 2,0-2,5 кг немесе Метошанс с.ұ. гектарына 2,0-2,5 кг шығу мөлшерінде өндөу жұмысын жүргізу. Ал, ак ұнтаққа қарсы жылыжайларда Луна транквилити, к.с. фунгицидін гектарына 0,6-1,0 л шығу мөлшерінде қолдануға болады.

Киярдың тамыр шірігіне және фузариозды солуга қарсы өскіндерді адын ала Превикур энерджи В.К. фунгицидімен гектарына 3-4 л шығу мөлшерінде суару ұсынылады.

- Биологиялық күрес шарасына қиярдың негізгі аураларына жалған ак ұнтаққа, ак ұнтаққа және бактериялы ауларына қарсы, аурудың алғашқы белгілері көріне салысымен Фитолавин, ВРК биофунгицидімен гектарына 2,0 л шығу мөлшерінде өндөу жұмысын жүргізу.

3) АгроНеркәсіптік кешен субъектісінің өнім көлемін үлгайту/өнімділікті арттыру/шығындарды азайту және т.б. сандық қорсеткіштерін көрсете отырып, ұсыныстарды қолдану нәтижелері бойынша күтілетін тиімділік;

Кияр дақылының өнімділігі 25-30 пайыздға артады деп күтілуде.

4) Кеңес беру фотосуреті





Кеңес беру есебі

тақырыбы «Картоп дақылының аурулары және олармен куресу шаралары»

күні
«04» шілде 2023 жыл

Кеңес беру орны:
Алматы облысы, Жамбыл ауданы,
Ұзынағаш ауылы, Райымбек батыр көшесі, 196 а үй.

Сарапшы Есжанов Т.К.
Феликс
Қолы

Басқарма төрағасы
«Ж.Жилембаев атындағы ҚазҰҚЖКФЗИ» ЖШС Дүйсембеков Б.А.

Қолы, м.о.



Есеп құрылымы

1) Кеңес беруді қажет ететін мәселе немесе мәселелер ауқымы;

Картоп дақылының аурулары және олармен курсу шаралары.

2) Кеңейтілген дәлдерді немесе қызметті жақсарту бойынша ұсыныстарды қамтуы тиіс берілген мәселені немесе мәселелер ауқымын шешуге арналған саратының ұсыныстары;

Картоп дақылының ауруларымен агротехникалық, алдын-алу, химиялық және биологиялық әдістерді қолдана күрсуге болады.

Агротехниалық шаралар – егісте ауруға төзімді және ерте пісетін сорттар мен гибридтер қолдану. Ауыспалы егістің сақталуы, егінді 3-4 жылдан кейін бастапқы орнына қайтару, алғы егістерді дұрыс тандау – тамыржемістер, кияр, қырыққабат, бұршақ тұқымдастар және асқабак.

- Адын алу шараларына – тұқымды, отырғызар алдын, бактериялық, саңырауқұлактық инфекцияларға және бастапқы өсу этапында зиянкестерге қарсы Селест топ 312,5, к.с. инсектофунгицидімен, 1 тонна тұқымға шығу мөлшері 3-4 литр. Жұмысшы ертіндінің шығу мөлшері 1 тонна тұқымға 10 л және Эместо квантум, к.с. инсектофунгицидімен, 1 тонна тұқымға шығу мөлшері 3-3,5 литр. Жұмысшы ертіндінің шығу мөлшері 1 тонна тұқымға 10 л есебінде өндеу жұмыстарын жүргізу.

- Химиялық шараларға - картоптың негізгі аураларының бірі альтернариозға қарсы қолданылатын химиялық шараны айтуға болады. Аурудың алғашқы белгілері көріне салысымен Тянь-Шань, 72% с.ү. гектарына 2,5 кг немесе Ратимил, 72% с.ү. гектарына 2,5 кг шығу мөлшерінде өндеу жұмысын жүргізу. Ал, вирусты ауруларға қарсы Фармайод 10% (0,05%) (2-дүркін өндеу жұмысын жүргізу). гектарына 0,6-1,0 л шығу мөлшерінде қолдануға болады. Сонымен қатар Фитоплазмин, ВРК гектарына 3,0-4,0 л шығу мөлшерінде қолдануға болады. Вирус ауруларын таратушы сорғыш зиянкестерге қарсы Энжио, 247 к.э. инсектицидімен гектарына 0,1 л шығу мөлшерінде өндеу жұмысын жүргізу қажет.

- Биологиялық күрес шарасына картоптың негізгі саңырауқұлак (альтернариоз, ризоктаниоз) және бактериялы ауларына қарсы, аурудың алғашқы белгілері көріне салысымен Фитолавин, ВРК және Фитоплазмин, ВРК биофунгицидтерімен гектарына 2,0 л шығу мөлшерінде өндеу жұмысын жүргізу.

3) Агрономеркәсіптік кешен субъектісінің өнім көлемін үлгайту/өнімділікті арттыру/шығындарды азайту және т.б. сандық көрсеткіштерін көрсете отырып, ұсыныстарды қолдану нәтижелері бойынша күтілетін тиімділік;

Кияр дақылының өнімділігі 25-30 пайызға артады деп күтілуде.

4) Кеңес беру фотосуреті

