



Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

NASEC

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Отчет

о проведении консультации на тему « Технология возделывания столовых корнеплодов (морковь, столовая свекла) и защита от болезней»

по направлению «Овощные культуры (в открытом и закрытом грунте) картофель, сахарная свекла»

Даты проведения:
«06» октября 2023 года

Место проведения консультации:
Алматинская область, Жамбылский район, п. Ұзынағаш, СПК «Белес
Агро».

Отечественный эксперт: Манабаева У.А.

(подпись)

Директор КХ « Белес Агро»: Ахметжанов Ж.А.



Председатель правления
ТОО «КазНИИПО» : Айтбаев Т.Е.

Структура отчета

1) Проблема или круг проблем, требующих консультирования;

Целью консультации является предоставление информации по технологии возделывания и защиты от болезней столовых корнеплодов (морковь, столовая свекла) отечественных сортов на юго-востоке республики. Обучение технологиям по возделыванию столовых корнеплодов и применение эффективными препаратами против болезней для получения высоких урожаев, с хорошими качествами.

2) Рекомендации эксперта по решению поставленной проблемы или круга проблем, которые должны включать в себя расширенные доводы и предложения по улучшению деятельности предприятия;

- Страйтесь размещать столовые корнеплоды вообще так, чтобы они не возвращались на одно и то же место не раньше чем через 3-4 года;

- Ранневесенне боронование в 2 следа, культивация предпосевная на глубину 12-14 см с боронованием и прикатыванием почвы перед посевом.

- высевайте семена в ранние сроки во влажную почву;

- обрабатывайте семена перед посевом с препаратом ТМТД из расчета 6-8 г/кг семян или фентиуром 3-4 г/кг;

- Обработка посевов против вредителей и болезней. От вредителей :морковь, Актеллик 500,к.э (морковная муха, листоблошки), на столовую свеклу(блошки, свекловидный клон, свекловичная муха) БИ-58 из расчета 0,5-0,8кг/га. Обрабатывать по мере необходимости. Против болезней во время вегетации использовать Ридомил голд 2,5л/га, Байлетон 25% с.п - 0,5кг/га.

- За время вегетации в зависимости от погодных условий необходимо провести 6-7 поливов. За месяц до уборки поливы прекратить. После каждого полива до смыкания рядков проводить культивацию.

- Уборку проводить до осенних заморозков.

3) Ожидаемый эффект по результатам применения рекомендаций субъектом АПК с указанием количественных показателей увеличения производства продукции/повышения производительности/снижения себестоимости и др;

При соблюдении севооборотов и рекомендованных возделывания столовых корнеплодов (морковь, столовая свекла) ожидается увеличения урожайность на 15-20 %.

4) Фотографии консультации

