



Министерство сельского хозяйства  
Республики Казахстан

NASEC

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АГРАРНЫЙ  
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

# Отчет

## о проведении консультации на тему « Технология возделывания белокочанной капусты и защита от вредителей» по направлению «Овощные культуры (в открытом и закрытом грунте) картофель, сахарная свекла»

Даты проведения:  
«26» октября 2023 года

Место проведения консультации:  
Алматинская область, Карагайский район, п. Қайнар, ИП «Баев».

Отечественный эксперт: Мендыгулова Л.Х.

Директор ИП « Баев»: Баев С.С.

Председатель правления  
ТОО «КазНИИПО» : Айтбаев Т.Е.



## **Структура отчета**

### **1) Проблема или круг проблем, требующих консультирования;**

Целью консультации является предоставление информации по технологии возделывания и защиты от болезней белокачанной капусты отечественных сортов на юго-востоке республики. Обучение технологиям по возделыванию капусты и применение эффективными препаратами против вредителей для получения высоких урожаев, с хорошими качествами.

### **2) Рекомендации эксперта по решению поставленной проблемы или круга проблем, которые должны включать в себя расширенные доводы и предложения по улучшению деятельности предприятия;**

-Правильный выбор сорта (гибрида) с учетом климатических условий региона , сроков созревания капусты и ее назначения;

-Капусту высаживают рассадным методом .Для получения здоровой рассады семена калибруют, обрабатывают, закаливают;

- Обрабатывайте семена перед посевом с препаратом ТМТД из расчета 6-8 г/кг семян ;

-Подкормка капусты осуществляется в два приема:1-после десяти дней после высадки рассады в грунт для роста и развития зеленой массы-розетки,2-во время завязывания кочанов для их образования и развития ;

- Обработка посевов против вредителей и болезней. Актеллик (20 мл на 10 л воды ,Энжио(5мл на 10л воды). являются комплексными инсектицидами против грызущих, так и сосущих .

- За время вегетации в зависимости от погодных условий необходимо провести 6-7 поливов. За месяц до уборки поливы прекратить. После каждого полива до смыкания рядков проводить культивацию.

- Уборку проводить до осенних заморозков в зависимости от срока созревания сорта (гибрида).

### **3) Ожидаемый эффект по результатам применения рекомендаций субъектом АПК с указанием количественных показателей увеличения производства продукции/повышения производительности/снижения себестоимости и др;**

При соблюдении севооборотов и рекомендованных возделывания белокачанной капусты ожидается увеличения урожайность на 20-25 %.

### **4) Фотографии консультации**

