

Отчет
о проведенных консультациях
на тему «Экстерьерные особенности адайских
лошадей»
по направлению «коневодство»

Даты проведения:

с «16» сентября по «17» сентября 2024 года

Место проведения консультации:

(Западно-Казахстанская область, Бокейординский район, с. Тимур Масин)

Проректор по науке

Исполнительный директор



Шәмшідін Ә.С.

Галимуллина М.Р.

Отчет по консультации

1. Кобыл для кумысных ферм подбирают по их молочной продуктивности, при этом учитывают породу, экстерьер, упитанность, живую массу и состояние упитанности жеребенка. Каждый косяк закрепляют на весь период дойки за одним дояром, который несет полную ответственность за количество и качество надоенного молока, следит за состоянием кобыл и жеребят. В косяк пускают жеребца, заранее подобранного по признаку высокой молочности (по материнской линии), удовлетворительным промерам, живой массе, упитанности, породности, экстерьеру, классности, состоянию здоровья и качеству потомства. В косяки не допускают кобыл, состоящих в родстве с жеребцами, чтобы избежать родственного спаривания.

2. Косяки формируют в раскольном базу в конце марта или начале апреля. Разбивку косяков и отбор кобыл для кумысной фермы ведут под наблюдением зоотехника.

3. Дойку кобыл начинают в мае и продолжают до октября. В первые десять дней доят кобыл не более трех раз в день с интервалом в 1,5-2 часа, затем число доек постепенно доводят до 5-6 в день. Наиболее молочных конематок доят и зимой. Таким образом, период доения кобыл продолжается 8-9 месяцев.

Понятно, что организация зимнего доения кобыл требует оборудованного помещения, запаса концентрированного корма, добротного сена.

Рабочий день на ферме начинается в 6 часов утра, после пригона кобыл сночной пастьбы и водопоя. Кобыл загоняют в раскол и отбивают жеребят от матерей. Жеребят содержат в изолированных загонах группами по 15-20 голов. Загоны должны быть оборудованы кормушками для концентрированных кормов, колодами для воды и навесами, защищающими молодняк от солнца. В таких загонах жеребята чувствуют себя свободно, и отлучка от матерей не сказывается на их росте и развитии.

4. При любом распорядке дня количество доек и интервалы между ними устанавливают с расчетом получения максимальных надоев.

5. Следует иметь в виду и другое: некоторые кобылы, особенно старые, в первые месяцы лактации не доятся без жеребят и требуют подсос обязательно только своего жеребенка. Приучение животных к бесподсосному методу во многом зависит от опытности дояров. Многие наблюдения показывают, что если с первых же дней доения к кобыле не подпускать жеребенка, то она быстро привыкает к бесподсосному доению и наоборот, если подпускать жеребенка с первых же дней доения, то в последующее время такие кобылы требуют подсоса.

Таким образом, доение бесподпуска жеребенка к матери оправдывает себя положительно, многие конематки быстро привыкли к бесподсосному методу, без задержки отдавали молоко.



Фото. Калмурзин Канат из Бокейординского района ЗКО.